Dr. Noura EL HANNI

Cabinet d'ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale — Casablanca

Ancienne Médecin à l'Hôpital 20 Août (Casablanca) · Perfectionnement CHU de Bordeaux & Institut Georges Portmann · DU Vertiges (Rabat)

drelhanni.ma

Fiche d'Information Médicale Patient

Bd Al Qods, Résidence Les Princes (Entrée B, 3e ét., N° 8) — Au-dessus du Labo Touzani, Aïn Chock, Casablanca

Tél : 05 22 52 67 77 · WhatsApp : 06 04 14 08 75 · Lun–Ven 09h–18h · Sam 09h–13h

Fiche 04 | ORL Pédiatrique & Audition

4 min de lecture

Otite séreuse et baisse d'audition de l'enfant : suivi et pose d'aérateurs (yoyos)

Souvent silencieuse et non douloureuse, l'otite séreuse correspond à la présence persistante de liquide derrière le tympan. Elle constitue la première cause de baisse d'audition réversible chez le jeune enfant.

★ L'essentiel en 3 points

- ✓ Contrairement à l'otite aiguë, l'otite séreuse ne donne généralement ni fièvre ni douleur intense : c'est la baisse d'audition qui doit alerter.
- ✓ La tympanométrie réalisée en 30 secondes au cabinet permet de mesurer objectivement la présence de liquide rétro-tympanique.
- ✓ Si l'épanchement persiste plus de 3 mois avec retentissement auditif, la pose d'aérateurs transtympaniques (yoyos) restaure immédiatement l'audition.

1. Comment reconnaître une otite séreuse chez votre enfant ?

L'otite séromuqueuse survient lorsque la trompe d'Eustache n'aère plus correctement l'oreille moyenne, souvent à la suite de rhinopharyngites ou d'une hypertrophie des végétations adénoïdes. Un liquide plus ou moins épais (« glue ear ») s'accumule derrière le tympan et freine la transmission des sons.

- **Enfant qui semble dans sa bulle, moins attentif à l'école ou qui fait répéter**
- **Retard d'acquisition des premiers mots ou difficultés de prononciation**
- **Épisodes répétés d'otites aiguës douloureuses venant surinfecter ce liquide**

2. Le bilan au cabinet : oto-endoscopie HD et tympanométrie

Au cabinet du Dr. Noura EL HANNI, l'oto-endoscopie couplée à une caméra HD est complétée par une tympanométrie indolore (courbe plate de type B confirmant l'épanchement) et une audiométrie adaptée à l'âge de l'enfant, qui chiffre la perte auditive en décibels.

3. Traitement médical et principe des aérateurs transtympaniques (yoyos)

Un traitement médical initial est toujours instauré avec un contrôle à 6–12 semaines. Lorsque l'otite séreuse bilatérale persiste plus de 3 mois avec une baisse auditive significative ou une souffrance du tympan, la pose d'un micro-aérateur (yoyo) à travers le tympan permet d'évacuer le liquide et d'aérer l'oreille moyenne pendant plusieurs mois avant son expulsion spontanée.

Points de surveillance importants pour les parents

- Retard de langage ou baisse des résultats scolaires chez un enfant enrhumé chronique
- Écoulement d'oreille (otorrhée) ou douleurs nocturnes récidivantes
- Rétraction du tympan constatée lors d'un examen médical

En cas d'urgence vitale, de détresse respiratoire ou de saignement abondant, contactez immédiatement le SAMU (141), la Protection Civile (15) ou les urgences les plus proches.